



INTRODUCCIÓN:

La Matanza de Acentejo es un municipio situado al noreste de la Isla de Tenerife, a unos 500 msnm formando parte de la denominada comarca de Acentejo. Tiene una forma alargada característica, de los barrancos y la pendiente que conforman la orografía del territorio, con un área desde la cumbre a la costa de 14,1km². Presentando la típica zonificación de los municipios de la isla: *Paisaje de cumbre – medianías – costa*, siendo la medianía el lugar donde se localiza el casco urbano, donde podemos encontrar tanto edificios que representan la arquitectura tradicional de la isla, como modernas instalaciones y equipamientos para el desarrollo y disfrute de la población tales como: El Complejo Deportivo, El Mercadillo del Agricultor, El Parque Natural El Montillo,...

El municipio, al igual que toda la Comarca presenta una topografía accidentada como consecuencia de la morfología abrupta que resultó de las coladas lávicas. Lo que ha condicionado el asentamiento de la población, la dimensión y el abancalamiento de los terrenos para uso agrícola.

La Matanza forma parte de dos importantes enclaves naturales de la Isla de Tenerife, que presentan dos ecosistemas naturales y paisajísticos muy diferentes:

EL PAISAJE PROTEGIDO DE LAS LAGUNETAS

En la zona de la cumbre, se localiza el ***Paisaje Protegido de Las Lagunetas***, compartido con otros municipios ya que cuenta con una superficie total de 3.568,30 ha¹, fue declarado por la Ley 12/1987 de 19 de junio. Representando un paisaje de media montaña con alto valor natural y paisajístico, ya que juega un papel importante en la recarga del acuífero y la conservación del suelo. Permitiendo al visitante, conocer las características del Monteverde y la transición hacia la zona de Pinar. Sus montes cuentan con muestras de pinar, cuya especie principal es el pinus canariensis, fayal-brezal y laurisilva que alberga numerosas especies de flora y fauna endémicas.

Foto





EL PAISAJE PROTEGIDO COSTA DE ACENTEJO.

En la zona de la costa, nos encontramos con el otro enclave natural del que forma parte el municipio. El ***Paisaje Protegido de la Costa de Acentejo***, que cuenta con una superficie total de 401 ha que fue declarado por la Ley 12/1987 y reclasificado a su actual categoría por la Ley 12/1994, de 19 de diciembre de Espacios Naturales de Canariasⁱⁱ. Espacio de una excepcional belleza, que se extiende desde la desembocadura del Barranco de Cabrera hasta la del Barranco de Acentejo, dominada por grandes y abruptos acantilados donde la verticalidad del territorio es la protagonista, lo que lo hace representativo de la geomorfología de la costa norte de la isla.

Foto: Costa de Acentejo





EL AGROPAISAJE RURAL DE LAS MEDIANIAS

Al mismo tiempo el municipio discurre desde la cumbre hacia la medianía a través de un paisaje conformado por los llamados “bosques de castaños”, siendo La Matanza de Acentejo el municipio más representativo en cuanto a la asociación del cultivo del castaño con otros cultivos destacando la asociación con el cultivo de la papa. Y a medida que descendemos conviven los conos volcánicos que forman las Montañas de San Antonio con la gran mayoría de las tierras de cultivo del municipio, lo que le ha dado gran fama a lo largo de los años como excelentes tierras para el cultivo de la papa y la vid, principales motores de la agricultura del municipio.

Foto: Medianías, “Bosque de Castaños”





Foto: Medianías, “Los Nateros”.



El lugar conocido como Los Nateros, está ubicado en las medianías del municipio de La Matanza de Acentejo, en torno a la cota 650 msnm. En esta zona agrícola por naturaleza, predominan principalmente los cultivos característicos de las Medianías del Norte de Tenerife, principalmente la viña y la papa, seguidos por el millo, las judías y las coles entre otros, intercalados en muchos casos con algunos frutales de pepita como los perales (Peral Trigo, Membrillo, Calabazate, etc.) u otros frutales como los castaños, los ciruelos, etc.

En la agricultura de medianías es común por parte de los agricultores realizar rotaciones de cultivos cuyo fin no es otro que obtener una mayor producción por superficie, siendo frecuentes las rotaciones de papas y millo o papa, millo y judía. También es frecuente plantar algún tipo de leguminosa como los chochos o algún cereal como el centeno y la avena, cuyo fin es la recuperación del terreno conjuntamente con la obtención de la cosecha.

Es frecuente también encontrar asociaciones de varios cultivos simultáneos, siendo las más habituales las de papas y millo, papas y coles en los bordes, etc. En algunas ocasiones se plantan leguminosas como los chochos y algún cereal como el centeno y la avena.

En cuanto al cultivo de la vid se refiere, el sistema tradicional en rastras hoy por hoy es el más extendido, aunque la reestructuración tiende hacia la espaldera sencilla. La



peculiaridad en el cultivo de la viña de sistema tradicional en rastras es que durante el invierno reposa extendida en el suelo, para protegerla del viento y en primavera las cepas son levantadas y sostenidas por medio de horquetillas, a poca distancia del suelo. Este sistema permite el aprovechamiento del terreno para otros cultivos como la papa durante los meses de invierno y primavera. La zona de Acentejo ha sido desde antiguo muy valorada por sus caldos que son generalmente tintos y frescos. Las variedades locales tradicionales más abundantes son Listán Negro, Negramoll, Castellana y Listán Blanco.

Recientemente se ha introducido en la zona otros sistemas de cultivo más modernos y que precisan menos mano de obra como son el sistema mejorado de “parral bajo” y el de “espaldera sencilla”.

A medida que aumentamos la cota, sobre los 750 msnm aumenta la densidad de castaños, siendo frecuente su asociación con el cultivo de las papas de secano. Esta asociación es posible y beneficiosa para ambos, al ser el castaño un árbol caduco que permite el paso de los rayos de luz necesarios para que se den estos tubérculos en la época de plantación de las papas, cubriéndose de follaje en la época menos propicia para el cultivo de los mismos.

A los 850 msnm la viña prácticamente desaparece predominando el castañar denso intercalado con plantaciones de papas, algún tipo de gramínea como la avena y chochos. A esta altitud el monte verde se entremezcla con los cultivos de papas y los castaños, ya que comienza la franja de dominio de este tipo de vegetación del terciario. Siendo a mayor altitud el monte verde el verdadero protagonista. También se puede observar zonas de pinar, generalmente de especies foráneas seguramente introducidas durante la primera mitad del siglo XX y bosquecillos de Eucaliptos (*Eucaliptus globulus*).